

Entsorgung

Pflanzenart	* Nur wenn geschreddert und wenig anorganisches Material	Kompostierung				Vergärung			Verbrennung
		Dezentrale Kompostierung	Feldrand-kompostierung	Gewerbliche Platz-kompostierung	Boxen-kompostierung	Flüssigvergärung (Co-Vergärung ohne Hygienisierung)	Flüssigvergärung (Co-Vergärung mit Hygienisierung)	Feststoff-vergärung (thermophil)	
Riesen-Bärenklau / Herkulesstaude	Oberirdisches Pflanzenmaterial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Samen / Blüten	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	Wurzeln/Rhizome	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Stauden-knöteriche	Oberirdisches Pflanzenmaterial	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	Samen / Blüten	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	Wurzeln/Rhizome	✗	✗	✗	✓*	✗	✓*	✓*	✓ empfohlen
Schmalblättriges Greiskraut	Oberirdisches Pflanzenmaterial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Samen / Blüten	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	Wurzeln/Rhizome	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Jakobs-kreuzkraut	Oberirdisches Pflanzenmaterial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Samen / Blüten	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	Wurzeln/Rhizome	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓



Riesen-Bärenklau / Herkulesstaude (*Heracleum mantegazzianum*)

April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
Einzelpflanzen, kleine, isolierte Vorkommen:						
[Redacted]		[Redacted]				[Redacted]
Wurzel 15 - 20 cm tief ausstechen / Ausgraben der Wurzel (ca. 60 cm tief)						dto.
			[Redacted]			
			Samenstand entfernen			
[Redacted]						
Blütenstand entfernen; mindestens alle 2 Wochen nachkontrollieren						
Flächige Vorkommen:						
[Redacted]		[Redacted]				
15 – 20 cm tief fräsen; Nachsaat mit schnell und dicht-wachsender Regiosaat						
[Redacted]						
Mahd / Mulchen alle 10 – 14 Tage						



Staudenknöteriche (*Fallopia sp.*)

April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober - April
Einzelpflanzen, kleine, isolierte Vorkommen:						
Ausreißen / Ausgraben / Ausbaggern (Vermessung und Erfassung des Bestandes während der Vegetationsperiode)						
Abdeckung mit Vlies (Vermessung und Erfassung des Bestandes während der Vegetationsperiode)						
Flächige Vorkommen:						
	Mahd (2 – 3malig)	1. Schnitt	2. Schnitt	3. Schnitt		
Mahd (6malig)	1. Schnitt	2. Schnitt	3. & 4. Schnitt	5. Schnitt	6. Schnitt	
Mahd (8malig)	1. & 2. Schnitt	3. & 4. Schnitt	5. & 6. Schnitt	7. Schnitt	8. Schnitt	



Kreuzkräuter (*Senecio sp.*)

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

Einzelpflanzen, kleine, isolierte Vorkommen:

Ausreißen (vor der Blüte), beim schmalblättrigen Greiskraut bis November

Flächige Vorkommen:

Mahd (vor der Blüte), beim schmalblättrigen Greiskraut bis November
Bestände von außen her ausreißen